

Caso: alberto, victoria

Datos del paciente

- Edad: 70 Años
- Hombre
- Peso: 80,00 kg
- Altura: 170 cm

Datos calculados

- Superficie corporal: 1,94 m². IMC: 27,68 kg/m².
- Índice de Comorbilidad de Charlson (CCI): 6 Estimación porcentaje de supervivencia a los 10 años (IS10): 2.25%
- Escala de Riesgo Anticolinérgico (ARS): 0 (dato útil para la evaluación del riesgo de efectos anticolinérgicos).

Clínica

- Anemia
- Angina de pecho
- Diabetes
- Falta de oxígeno
- Hiperplasia benigna próstata
- Insuficiencia cardíaca
- Lentigo maligno melanoma
- Síndrome ortostático

Fármacos

- Acido acetilsalicílico cardio VÍA ORAL MG (100 / 1 Días)
- ATACAND 32MG 28 COMPRIMIDOS (1 / 1 Días)
- Atorvastatina VÍA ORAL MG (80 / 1 Días)
- AVIDART 0,5MG 30 CAPSULAS BLANDAS (1 / 1 Días)
- BYETTA 10MCG 1 PLUMA PRECARGADA SOLUCION INYECTABL 60 DOSIS (0.04 / 12 Horas)
- EMCONCOR 5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS (1 / 12 Horas)
- LANTUS 100 UNIDAD/ML SOLOSTAR 5 PLUMAS 3ML SOL INY (1 / 12 Horas)
- Metformina VÍA ORAL MG (850 / 1 Días)
- Pantoprazol VÍA ORAL MG (20 / 1 Días)

- PROCORALAN 5MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (1 / 12 Horas)
- RANEXA 750MG 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA (1 / 12 Horas)
- UNIKET 20MG 80 COMPRIMIDOS (1 / 8 Horas)
- ZAYASEL 1MG/ML 150ML 1 FRASCO SOLUCION ORAL EFG (2.5 / 1 Días)
- ZYLORIC 300MG 30 COMPRIMIDOS (1 / 1 Días)

Sugerencias para ayudar a reducir posibles problemas yatrogénicos

Valorar acciones por escenarios clínicos

- Con metformina vigilar función renal por tomar otros fármacos que pueden afectar a la función renal.

Contraindicaciones (considerar buscar alternativas o evaluar su necesidad)

- Metformina » Insuficiencia cardíaca
- Metformina » Insuficiencia respiratoria grave (Falta de oxígeno)
- ZAYASEL » (**con insuficiencia cardíaca:** Contraindicado)

Valorar acciones por interacciones importantes o incompatibilidades

- Buscar alternativas por mayor riesgo de **hipoglucemia:** BYETTA «» LANTUS

Valorar acciones por interacciones relevantes

- Vigilar **prolongación QT:** RANEXA «» PROCORALAN .
- Vigilar efectos adversos **zayasel.** Vigilar **hipotensión ortostática:** EMCONCOR » ZAYASEL .
- Espaciar **4 horas:** BYETTA « Pantoprazol.
Se **reduce** la **absorción** de **byetta.**
- Espaciar **2 horas:** Atorvastatina « BYETTA.
Se **reduce** la **absorción** de **atorvastatina.**

Vigilar posible aumento de efectos adversos (dosis altas)

- ATACAND: Candesartán

Algunos efectos adversos frecuentes: Vértigo, aumento de Potasio, Cefalea, Hipotensión ortostática, Hipotensión, Parestesias.

- Atorvastatina

Algunos efectos adversos frecuentes: aumento de Glucosa, aumento de Creatinina, Artralgias, Mialgias, Dolor de espalda, Rinofaringitis.

- BYETTA: Exenatida

Algunos efectos adversos frecuentes: Náuseas, Vómitos, Diarrea.

- EMCONCOR: Bisoprolol

Algunos efectos adversos frecuentes: Hipotensión, Mareos, Bradicardia, Alteraciones visuales, Edema EEII, Astenia, Retención de líquidos, Hipotensión ortostática, Frialdad en extremidades.

- LANTUS: Insulina glargina

Algunos efectos adversos frecuentes: disminución de Glucosa, Sudoración, Somnolencia, Confusión, Temblores, Caídas.

- RANEXA: Ranolazina

Algunos efectos adversos frecuentes: aumento de Creatinina, Astenia, Cefalea, Estreñimiento, Náuseas, Vómitos, Mareos.

Variaciones por dosis fuera de rango

- BYETTA: Exenatida

Considerar reducir dosis. Rango terapéutico: 0,01 - 0,02 MG / Día (para diabetes)

- LANTUS: Insulina glargina

Considerar reducir dosis. Rango terapéutico: 13 - 83 UI / Día (para diabetes con beta bloqueantes (emconcor))

Acciones por Criterios STOPP

- Evaluar buscar alternativas a betabloqueantes en la diabetes mellitus si se dan frecuentes episodios de hipoglucemia.
 - EMCONCOR » Diabetes

Acciones por Criterios START

- Iniciar oxígeno domiciliario en pacientes que presenten insuficiencia respiratoria tipo I o tipo II.