

Aula de Practica Farmaceutica

Universidad CEU-Cardenal Herrera

Paciente D. Joaquín, farmacéutico Luis Salar

2 de diciembre de 2011

INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA

Medicación que toma:

1. Anasma 50/500 (salmeterol, fluticasona), 1/0/1
2. Spiriva 18 mcg (tiotropio bromuro), 1/0/0
3. Acetilcisteína 600 eferv., 1/0/0
4. Cuando sale de un ingreso en hospital toma 7 días Augmentine 500 (2/0/2) + Dacortin 5 + Omeprazol 20

Otra información sobre medicamentos:

- Conoce perfectamente su medicación y la usa bien.
- El Anasma le deja la boca seca, por lo que se enjuaga y lava los dientes.
- Cuando toma Dacortin le salen manchas en las muñecas, tiene la piel muy sensible.
- Tomó Theo Dur, pero tuvo que dejarlo porque le producía taquicardia y ansiedad.
- Cuando le duele la cabeza (muy de vez en cuando) toma Paracetamol.

Otra información:

- Usa oxigenoterapia continua domiciliaria : flujo 2,5 l/m que baja a 1,5 l/m cuando esta en casa.
- Actividad y ejercicio físico adecuados.
- Comoce y practica programa de rehabilitación respiratoria.
- Es socio fundador de la Asociación Valenciana de EPOC.

QUÉ HIZO AYER

-A las 8h, 1 Anasma +1 Spiriva + 1 Acetilcisteína

-A las 20 h, cena, 1 Anasma

EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA

1.Anasma. Necesario. Efectivo. Seguro.

2.Spiriva. Necesario. Efectivo. Seguro.

3.Acetilcisteina. Necesario. Efectivo. Seguro.

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO

El tratamiento instaurado en el paciente es el correcto y está avalado con:

-Evidencia A para Anasma (glucocorticoide y agonista beta-2 de acción prolongada)

-Evidencia A para Spiriva. Estudios recientes han confirmado una mejoría sostenida en la función pulmonar, la seguridad en el numero de exacerbaciones y un impacto favorable sobre la supervivencia.

-Evidencia B para tratamientos con agentes mucoliticos.

INFORME OTRAS TERAPIAS

Nada que añadir ni objetar.

INFORME A SU FARMACÉUTICO

Felicitarle por la atención prestada a D. Joaquín, animarle a que continúe en esa línea y, en todo caso, que le recuerde la conveniencia de recibir la vacuna antigripal y /o vacuna nemococcica, especialmente recomendada para estos pacientes en la prevención de complicaciones en neumonía.´