

**D. Miguel , 67 años, farmacéutica Ester Marco,
Farmacia Andres Navarro
31 de octubre de 2012**

INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA

Medicación que toma:

- 1 .Eutirox 137 µg **microgramos** (levotiroxina) 1/0/0 desde hacer 7 meses
2. Omeprazol 20 mg, 1/0/0
3. Atorvastatina 10 mg, 0/0/1
4. Losartan 100 mg, 1/0/0
5. Losartan 50 mg , 0/0/1
6. Tebetane (Alanina, Glicina, Glutámico ácido, Pygeum africanum),1/0/1
7. Narine Repetab 5 mg de loratadina y 120 mg de sulfato de pseudoefedrina.
(cuando resfriado)

Otra información sobre medicamentos:

El paciente refiere estar bien y controlado desde su operación de Tiroides hace 7 meses. Durante tres años tomo Urolosin Ocas 0,4 mg (tamsulosina) comprimidos de liberación prolongada por Síntomas del tracto urinario inferior (STUI). Según el paciente los síntomas mejoraron y ahora toma Tebetane.

La PA dice tenerla en 140/80 mmHg.

TSH 1,58 mU/l

T4 libre 1,5 ng/dl

Colesterol total: 141 mg/dl

Colesterol HDL 38 mg/dl

Colesterol LDL 75 mg/dl

Trigliceridos 138 mg/dl

Creatinina elevada se esperará la próxima analítica de noviembre.

Potasio 4,6mEq /l

Dice que todo le va bien, conoce perfectamente su medicación y la toma,

Otra informacion:

Todos los días anda unos cuantos kilómetros

EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA

Eutirox : (H03AA: Hormonas tiroideas. Levoritoxina)

Necesario, Efectivo, Seguro

Omeprazol. (A02BC: Antiulcerosos inhibidores de la bomba de protones)

Necesario, Efectivo, Seguro

Atorvastatina. (C10AA: Hipolipemiantes: inhibidores de la HMG COA reductasa)

Necesaria, Efectiva, Segura?

Losartan (C09CA: Antagonistas de la angiotensina II)

Necesario, Efectivo, No seguro

Tebetane G04CX: Otros fármacos usados en la hipertrofia prostática benigna

Necesario, Efectivo, Seguro

Narine: (R01BA: Descongestionantes nasales uso sistémico: simpaticomiméticos)

No necesario, No seguro

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO

El losatan no es tratamiento de primera línea para la HTA, además lleva una dosis alta de Losartan, la dosis máxima recomendada según bibliografía es de 100 mg. Por ser un medicamento que afecta al sistema renina-angiotensina-aldosterona, sería conveniente medir sus valores de urea y creatinina. Tiene valores altos de creatinina y tiene una revisión la próxima semana.

Sus valores de PA son altos, debería ser revisado tu tratamiento.

Si bien el paciente refiere tener mucho moqueo molesto cuando se resfría, no se encuentra adecuado el uso de Narine repetidamente se sugiere indicar otro antihistamínico cuando resfriado, sin presencia de pseudoefedrina.